ЛАБОРАТОРИЯ CibaLab

Последователност на епруветките при вземане на кръв	Тип на добавката	Миксиране на епруветката	Вид изследвания
	Аеробна → Анаеробна	8 - 10 пъти	Хемокултура
 	Епруветка за серум без гел Епруветка за серум с гел	5 – 6 пъти	Биохимични показатели Електролити и олигоелементи Миокардни маркери Специфични белтъци Електрофореза на белтъци Хормони; Туморни маркери Лекарствено мониториране Имунологични показатели Показатели за алергия Вирусология и паразитология
	Натриев цитрат Разреждане 1:10	3 – 4 пъти	Протромбиново време, INR, APTT, Фибриноген D- димер, ATIII, Protein C, Protein S
	K2EDTA	Не е необходимо	Микроелементи: Желязо и ЖСК; Цинк, Мед, Йод, Селен
	Li/Na Heparin	8 – 10 пъти	Имунохематология (кръвни групи, Rh, ало-авто еритроантитела) Quantiferon
	K2EDTA и гел	8 – 10 пъти	PCR за хепатит B и C Ренин ACTH Aldosteron BNP
	K2EDTA	8 – 10 пъти	ПКК, ДКК, СУЕ, Морфология на еритроцити, Ретикулоцити Таласемии и хемоглобинози Фолат в еритроцити Гликиран хемоглобин Имунофенотипизиране Предразположение към тромбоза PCR за инфекциозна мононуклеоза